

## FE DE ERRATAS

En el Volumen 67, número 2, página 179, Cuadro 6, donde dice “pH al agua” debe decir “Hierro disponible (mg kg<sup>-1</sup>)”.

**Cuadro 6. Valores promedio de hierro disponible para la interacción suelo × dosis de azufre elemental × tiempo de incubación.**

**Table 6. Average values of available iron in relation with the interaction between soil, S° rate and incubation time.**

Suelo	Hierro disponible (mg kg <sup>-1</sup> ) Dosis de azufre elemental (mg kg <sup>-1</sup> )			
	0	500	1.000	Promedio
Toledo				
60 días	7,93 a	8,17 a	8,93 a	
120 días	7,33 a	7,10 a	7,00 a	7,74
La Compañía				
60 días	3,40 a	4,13 a	4,50 a	
120 días	2,83 a	4,63 a	7,33 a	4,47
Xeres				
60 días	11,73 c	16,00 c	22,67 b	
120 días	10,97 c	20,17 bc	34,53 a	19,35
Pichasca				
60 días	4,67 a	4,63 a	4,47 a	
120 días	4,00 a	3,93 a	3,93 a	4,27
El Higueral				
60 días	4,20 a	4,23 a	4,10 a	
120 días	4,10 a	4,20 a	3,87 a	4,12
Pueblo Viejo				
60 días	6,40 c	8,33 bc	14,57 b	
120 días	5,40 c	9,63 bc	26,97 a	11,88

\* Letras minúsculas diferentes en sentido vertical y horizontal, dentro de cada suelo indican diferencias significativas entre la interacción, según la prueba de Tukey (P ≤ 0,05).