Tratamiento endovascular de la disección aórtica tipo B mediante endoprótesis

Renato Mertens M¹, Ivette Arriagada J, Francisco Valdés E¹, Albrecht Krämer Sch¹, Leopoldo Mariné M¹, Michel Bergoeing R¹, Sandra Braun J², Iván Godoy J², Samuel Córdova A², Alvaro Huete G³, Jeannette Vergara G^{1a}, Claudia Carvajal N^a.

Endovascular treatment of type B aortic dissection

Background: Dissections that involve the ascending aorta are classified as type A, regardless of the site of the primary intimal tear, and all other dissections as type B. Type B dissections can have fatal ischemic and hemorrhagic complications. In the chronic state, dilatation and rupture can be mortal. Endovascular surgery is a therapeutic alternative, considering the high rate of complications of conventional surgery. **Aim:** To report the results of endovascular treatment of type B aortic dissection. **Material and methods:** Report of 36 treated patients (30 males) aged 43 to 87 years, with a type B aortic dissection. Seventy eight percent were hypertensive and 39% smoked. The diagnosis was confirmed by CAT scan. Acute patients were treated for complications and chronic patients, for dilatation. In the operating room, an endoprosthesis was placed through the femoral artery, to cover the tear. The tear was located and the lumens were differentiated using angiography and transesophageal echocardiography. **Results:** All procedures were successful. In 16 acute dissections the indications were malperfusion syndrome or unmanageable hypertension in seven patients and imminent rupture or persistent pain in nine. Twenty chronic patients were operated due to dilatation (mean 6 cm). One patient died due to cardiac failure. One patient had a transient paraparesia and two had pulmonary embolism. No patient died in a follow up period ranging from 2.5 to 74 months. Four patients required a new aortic endovascular procedure due to progressive dilatation or endoleak. **Conclusion:** Endovascular treatment of type B aortic dissection has good immediate and long term results (Rev Méd Chile 2008; 136: 1431-8). **(Key words:** Aortic aneurism; Aortic dissection; Stents)

Recibido el 24 de abril, 2008. Aceptado el 29 de julio, 2008.

Departamento de Cirugía Vascular y Endovascular, División de Cirugía¹, Departamentos de Enfermedades Cardiovasculares² y de Radiología³, Pontificia Universidad Católica de Chile.

^aEnfermera Universitaria

Correspondencia a: Dr. Renato Mertens M. Apoquindo 3990, oficina 601, Santiago. Fono: (56 2) 207 0721. Fax: (56 2) 207 0718. E mail: rmertens@manquehue.net

La disección aórtica tipo B consiste en el Ldesgarro de la íntima de la aorta torácica descendente, habitualmente inmediatamente distal al nacimiento de la arteria subclavia izquierda, con la formación de un canal paralelo al lumen natural denominado lumen falso. Este último se propaga hacia distal y puede producir compresión del lumen verdadero, causando estenosis u obstrucción de ramas que nacen de la aorta al avanzar hacia éstas y generando el debilitamiento de la pared, facilitando la ruptura aguda o la formación de un aneurisma en la etapa crónica.

En los últimos años el desarrollo de técnicas endovasculares mínimamente invasivas ha permitido el tratamiento exitoso de múltiples patologías graves de la aorta torácica y abdominal que de otra manera requerirían de extensos procedimientos quirúrgicos¹⁻⁵.

En 1999, simultáneamente los doctores Dake, de Estados Unidos de Norteamérica, y Nienaber, de Alemania, reportaron la posibilidad de aplicar el uso de una endoprótesis para tratar la disección aórtica aguda complicada^{6,7}. Sus resultados fueron alentadores en una patología donde la cirugía tradicional ofrece malos resultados⁸. Por otro lado, al menos en los pacientes sin complicaciones el tratamiento médico presenta buenos resultados^{9,10}.

Comunicamos nuestra experiencia en el tratamiento endovascular de esta grave condición.

MATERIAL Y MÉTODO

En el año 2001 iniciamos un protocolo prospectivo para el tratamiento endovascular de patología de la aorta torácica descendente y tóraco-abdominal, incorporando a pacientes portadores de disección aórtica tipo B en su fase aguda y crónica, definiendo arbitrariamente la diferencia entre ambas, los 30 días de evolución.

El diagnóstico estuvo basado en un cuadro clínico compatible y la obtención de imágenes mediante ecocardiografía transesofágica o tomografía axial computada.

Las indicaciones para este tratamiento en la etapa aguda se dividieron en dos grupos. El primero constituido por pacientes con amenaza de ruptura aórtica, definida como crecimiento rápido del diámetro aórtico, dolor torácico persis-

tente, derrame pleural en aumento o hematoma periaórtico. El segundo grupo es conformado por pacientes con síndrome de malaperfusión, definido como el colapso del lumen verdadero y la disminución de la perfusión renal, visceral o de las extremidades inferiores. No se trataron en la etapa aguda pacientes con buena respuesta al tratamiento médico. En la etapa crónica se indicó el procedimiento en pacientes portadores de dilatación aneurismática mayor a 5 cm.

Previo al procedimiento, todos los pacientes fueron evaluados mediante tomografía axial computada helicoidal multicorte con contraste en fase arterial, obteniendo reconstrucciones axiales cada 3,75 mm o menos, con la posibilidad de obtener reconstrucciones coronales o sagitales.

Los criterios para ser incluidos en el protocolo endovascular fueron:

1. Factibilidad de acceso a través de las arterias femorales o ilíacas para introducir un dispositivo de alto diámetro, pudiendo llegar a los 26 F.
2. Presencia de un segmento no comprometido de aorta para la fijación proximal del dispositivo de al menos 15 mm inmediatamente distal al origen de la arteria carótida común izquierda en el arco aórtico, considerando la posibilidad de ocluir el origen de la arteria subclavia izquierda en forma programada en caso de requerirlo.
3. La posibilidad de iniciar un protocolo de seguimiento a largo plazo.
4. La disponibilidad inmediata del dispositivo en los casos agudos y la accesibilidad diferida en los casos crónicos.

La evaluación preoperatoria incluyó los parámetros básicos necesarios para un procedimiento de esta envergadura.

Todos los procedimientos fueron realizados en pabellón quirúrgico o sala de angiografía, bajo anestesia general y monitorización invasiva.

Para la generación de las imágenes intraoperatorias se utilizó en la sala de operaciones un angiógrafo digital portátil Siremobil (Siemens®, Alemania) u OEC serie 9.800 (General Electric®, EE.UU.).

La prótesis fue insertada previa denudación y arteriotomía de la arteria femoral común seguida de su reparación quirúrgica. Esto último debido a que el alto diámetro del sistema introductor del dispositivo impide su uso percutáneo.

El procedimiento fue realizado bajo heparinización sistémica, manteniendo el tiempo de coagulación activado (ACT) sobre 300 s. Se utilizó radioscopia, angiografía por sustracción digital y esencialmente apoyo con ecocardiografía transesofágica para orientar y desplegar la endoprótesis en el lugar apropiado, en particular en la definición de los lúmenes verdadero y falso de la lesión y el o los lugares de comunicación entre ambos.

La mortalidad operatoria fue definida como intrahospitalaria o antes de 30 días.

Endofuga o endoleak fue definida como persistencia de flujo hacia el falso lumen, detectada mediante tomografía axial computada. Utilizamos la nomenclatura habitual reconocida para este tipo de complicaciones: Tipo I son filtraciones a través del sitio de anclaje proximal de la endoprótesis en la aorta, las tipo II son dependientes de ramas que se originan del segmento de aorta tratado, tipo III se producen por falla estructural de la endoprótesis.

Éxito técnico fue definido como el despliegue de la endoprótesis en el lumen verdadero, cierre de la comunicación más proximal entre el lumen verdadero y falso y la inducción de trombosis del

falso lumen a nivel torácico en relación con la endoprótesis (Figuras 1 y 2).

Previo al alta se realizó una tomografía axial computada helicoidal con contraste en fase arterial para la evaluación de la localización de la endoprótesis y la presencia de endofugas. Si la tomografía resultaba satisfactoria se programaba un control a los 6 y 12 meses, luego anualmente.

RESULTADOS

Entre octubre de 2001 y agosto de 2007, 36 pacientes consecutivos, portadores de disección aórtica tipo B, fueron tratados con endoprótesis torácica, previo consentimiento informado. El promedio de edad fue 60,9 años (rango 43-87). El 83% (n =30) eran hombres. Las comorbilidades se detallan en la Tabla 1, las más frecuentes son la hipertensión arterial (77,8%), el tabaquismo (38,9%) y la dislipidemia (25%).

En todos los pacientes, el diagnóstico de disección aórtica se hizo por tomografía computada.

En 16 pacientes, la indicación de endoprótesis fue la presencia de complicación de una disección

Figura 1. Angiografía con inyección de contraste en el arco aórtico previa al despliegue de la endoprótesis. Se observa llenado inmediato del falso lumen.

Figura 2. Angiografía con inyección de contraste en el arco aórtico posterior al despliegue de la endoprótesis. Se visualiza llenado del lumen verdadero con exclusión del falso lumen.

Tabla 1. Patologías asociadas en los 36 pacientes tratados por disección de aorta torácica tipo B entre octubre de 2001 y agosto de 2007

Comorbilidad	%	n
Hipertensión arterial	77,8	28
Tabaquismo	38,9	14
Dislipidemia	25,0	9
Obesidad	11,1	4
Insuficiencia renal crónica	8,3	3
Enfermedad de Marfan	8,3	3
Cardiopatía coronaria	5,6	2

aórtica aguda complicada. En 9 de estos pacientes por ruptura inminente debido a dilatación aguda o dolor persistente y en 7 pacientes, por hipertensión arterial inmanejable o síndrome de malperfusión. Las indicaciones se detallan en la Tabla 2.

La indicación de endoprótesis fue la dilatación aneurismática mayor a 5 cm por disección aórtica crónica en 20 de los pacientes. El diámetro promedio del aneurisma en estos pacientes fue de 6 cm.

Las endoprótesis utilizadas se describen en la Tabla 3, utilizándose sólo dispositivos comercialmente disponibles.

En el intraoperatorio se produjo un desgarro de la arteria femoral en un paciente, que se solucionó localmente mediante un puente arterial. En el periodo de postoperatorio precoz, se registraron 2 casos de embolia pulmonar demostrados

por tomografía axial computada (5,5%). No hubo falla renal ni respiratoria asociada.

En todos los pacientes se obtuvo mejoría sintomática. No hubo conversión a cirugía abierta. Éxito técnico en 100% de los pacientes.

La hospitalización postoperatoria se extendió, en promedio, por 6,8 días (rango 1 a 64, DE 10,9). Fue necesario transfundir, entre 2 y 4 unidades de glóbulos rojos a sólo 5 pacientes (13,9%).

No se registraron casos de accidente cerebrovascular. Hubo un paciente (2,8%) que presentó paraplegia en el postoperatorio inmediato. Tuvo buena respuesta al tratamiento inmediato con perfusión vertebral mediante stent de la arteria subclavia izquierda, la que había sido cubierta intencionalmente con la endoprótesis, drenaje espinal para disminuir la presión del líquido cefalorraquídeo, corticoides y kinesioterapia, re-

Tabla 2. Indicación de endoprótesis en 36 pacientes tratados por disección aorta torácica tipo B entre octubre de 2001 y agosto de 2007

Indicación	n	%
Disección aórtica crónica con dilatación aneurismática >5 cm	20	55,6
Complicación de disección aórtica aguda	16	
Pseudocoartación	7	19,4
Úlcera penetrante con disección localizada y dolor	4	11,1
Dilatación aguda	4	11,1
Hematoma periaórtico – derrame pleural izquierdo	1	2,8

Tabla 3. Prótesis utilizadas en 36 pacientes tratados por disección de aorta torácica tipo B entre octubre de 2001 y agosto de 2007

Endoprótesis utilizada	%	n
Talent/Valiant (Medtronic®, EE.UU.)	41,7	15
TX2 (COOK®, EE.UU.)	38,9	14
TAG (Goretex®, EE.UU.)	19,4	7

cuperándose hasta la deambulaci3n sin ayuda, control esfinteriano completo y reintegraci3n laboral, pero con una paresia leve persistente.

La mortalidad perioperatoria fue de 2,8%, que correspondi3 a una paciente que present3 un infarto al miocardio antes de 24 h demostrado por necropsia.

Se obtuvo seguimiento cl3nico en 100% de los pacientes por un periodo promedio de 30 meses (rango 2,5-74,3).

Seguimiento imagenol3gico con tomograf3a computada o ultrasonograf3a transesofágica se obtuvo en 80% de los pacientes al momento del cierre del estudio, por un periodo promedio de 21 meses (rango 0,1-74,3). En 100% de estos pacientes se ha logrado la trombosis del falso lumen a nivel de la endopr3tesis.

Se han reintervenido 5 pacientes. Cuatro de ellos por desarrollo de una endofuga tipo I, en 3 de ellos el tratamiento consisti3 en la extensi3n de la endopr3tesis insertando un nuevo segmento y en uno de ellos en la embolizaci3n de la endofuga. Un paciente requiri3 de la instalaci3n de un stent de arteria renal por el desarrollo de isquemia renal secundaria a la progresi3n de la disecci3n.

Cuatro pacientes presentan endofuga tipo II, sin desarrollo de dilataci3n a3rtica. No han sido intervenidos y se mantienen en seguimiento. No hemos observado casos de migraci3n ni de fractura de la endopr3tesis.

No ha habido mortalidad tard3a.

DISCUSI3N

La disecci3n a3rtica tipo B es una enfermedad grave que puede seguir m3ltiples cursos cl3nicos⁸. En la mayor3a de los casos el paciente debuta s3lo con dolor torácico intenso pero transitorio y con

manejo m3dico de la hipertensi3n, los resultados inmediatos son buenos, siendo necesario el seguimiento con imágenes para detecci3n precoz de la principal complicaci3n en la etapa cr3nica: la dilataci3n y formaci3n de un aneurisma^{9,10}.

Sin embargo, 22% de los pacientes requieren de intervenci3n aguda por complicaciones⁸, las que pueden dividirse en dos grupos, el primero es la amenaza de ruptura a3rtica o ruptura franca, que se manifiesta por dolor persistente, aparici3n de derrame pleural denso o compromiso hemodinámico por hemorragia (Figura 3). El segundo grupo consiste en complicaciones de tipo isquémico, que pueden ir desde la isquemia localizada de un 3rgano o extremidad por compresi3n del lumen de la arteria que lo irriga por avance de la disecci3n, hipertensi3n intratable por un fen3meno de pseudocoartaci3n dinámico de la aorta, producida por hipertensi3n del lumen falso y colapso del lumen verdadero intermitentemente durante el ciclo card3aco o la pseudocoartaci3n permanente, su forma m3s grave, con isquemia global visceral, renal y de extremidades inferiores (Figura 4).

La sobrevida de los pacientes portadores de una disecci3n tipo B es limitada, 12% fallece globalmente en el hospital y 28% fallece antes de un a3o⁸.

Es el grupo que presenta complicaciones agudas donde el procedimiento endovascular puede resolver en forma expedita y poco invasiva^{6,7} un problema que la cirurg3a abierta requerir3a de extensos y cruentos procedimientos con una alta morbimortalidad asociada^{8,11}.

En la etapa cr3nica la aorta puede dilatarse y formar un aneurisma que puede llevar a ruptura y muerte, es as3 como alrededor de un tercio de los pacientes portadores de una disecci3n tipo B cr3nica desarrollarán un aneurisma. Se han buscado elementos predictivos que puedan sugerir

Figura 3. Reconstrucción axial de tomografía axial computada con contraste en fase arterial. Muestra dilatación aguda de la aorta asociada a derrame pleural denso periaórtico en un paciente con dolor torácico persistente.

Figura 4a. Reconstrucción axial de tomografía axial computada con contraste en fase arterial. Muestra coartación aguda del lumen verdadero en paciente con isquemia aguda visceral y de extremidades inferiores.

Figura 4b. El mismo paciente luego del despliegue de endoprótesis. Se demuestra ampliación del lumen verdadero y ausencia de flujo en lumen falso.

durante la etapa aguda cuál paciente desarrollará un aneurisma posteriormente. La dilatación aguda de la aorta a un diámetro mayor de 4 cm, especialmente si es asociado a persistencia de flujo en el falso lumen es un elemento predictivo importante¹². La presencia de hipertensión no controlada, síndrome de Marfán y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son también factores independientes que predicen eventual dilatación¹³. Recientemente se ha descrito al diámetro del falso lumen a nivel de la aorta torácica descendente proximal mayor de 22 mm como un elemento muy sensible y específico para predecir la dilatación¹⁴. Está pendiente evaluar si acaso el tratamiento endovascular precoz de estos pacientes seleccionados determinará una reducción de la

dilatación progresiva, pero es posible que así sea, por otro lado ese grupo de pacientes es normalmente el que tiene una peor respuesta al tratamiento médico en la etapa aguda, presentándose con dolor persistente o isquemia que finalmente lleva a indicar un procedimiento endovascular precoz.

Consideramos muy satisfactorios los resultados obtenidos en el tratamiento de esta grave patología. En la fase aguda todos los pacientes resolvieron el síntoma que motivó el procedimiento y no hubo mortalidad operatoria. En la etapa crónica, fallece sólo un paciente de una causa no relacionada con la técnica.

El seguimiento con imágenes periódicas es crítico para poder diagnosticar fallas asintomáti-

cas, antes de que se genere una complicación clínicamente relevante. Esto ha sido demostrado por otros grupos, incluyendo las fallas mecánicas de la endoprótesis, por fractura de los stents metálicos o ruptura de la tela impermeable¹⁵. Aunque el objetivo terapéutico se obtuvo en todos los pacientes, cuatro han requerido una reintervención aórtica durante el seguimiento alejado, todos tratados exitosamente por vía endovascular. Ningún caso ha sido convertido a cirugía abierta.

Los resultados comunicados por otros grupos han sido también muy satisfactorios. Mostrando resolución de los síntomas en la etapa aguda y eventual remodelación de la aorta torácica, con tendencia a disminución u obliteración del lumen falso y aún más importante que este hecho morfológico, es la baja incidencia de crecimiento o ruptura en la fase crónica¹⁶⁻²⁰.

La pregunta obvia es si el resultado es tan favorable, ¿por qué no tratar con endoprótesis a todos los pacientes portadores de disección tipo B en la etapa aguda? Se ha diseñado un estudio prospectivo y randomizado para contestar esta

pregunta²¹, aunque sus resultados no han sido reportados en la literatura, han sido presentados por nuestro grupo en conferencias, mostrando que la mortalidad es mayor a 12 meses de seguimiento en los pacientes intervenidos que en los tratados médicamente. Por este motivo y mientras no se cuente con información confiable, pensamos que el limitar este procedimiento sólo a los pacientes con complicaciones es lo indicado, esto ha sido confirmado por un reciente consenso de expertos²². Así mismo, en dicho trabajo se ha hecho un intento en aclarar algunas definiciones e indicaciones, sin embargo su metodología lamentablemente dista de ser precisa al no contarse con series prospectivas y aleatorias que permitan llegar a conclusiones claras.

Nuestros resultados inmediatos y a mediano plazo con el uso de este procedimiento, asociado a los buenos resultados reportados en la literatura, nos ha permitido considerar a esta técnica como una opción de primera línea en el manejo de pacientes con complicaciones de esta grave patología.

REFERENCIAS

1. MERTENS R, VALDÉS F, KÄMER A. Tratamiento Endovascular del Aneurisma de Aorta. *Revista Chilena de Cirugía* 2004; 56: 3-11.
2. MERTENS R, VALDÉS F, KRÄMER A, MARINÉ L, IRARRÁZAVAL M, MORÁN S ET AL. Tratamiento endovascular del aneurisma de aorta torácica descendente. *Rev Méd Chile* 2003; 131: 390-6.
3. VALDÉS F, MERTENS R, KRÄMER A, BERGOEING M, MARINÉ L, CANESSA R ET AL. Tratamiento Endovascular de Aneurisma Aórtico Abdominal: Resultados en 80 Pacientes Consecutivos. *Rev Méd Chile* 2006; 134: 1265-74.
4. MERTENS R, VALDÉS F, KRÄMER A, BERGOEING M, ZALACUETT R, BAEZA C ET AL. Tratamiento endovascular del trauma de aorta descendente. *Rev Méd Chile* 2005; 133: 403-8.
5. MERTENS R, VALDÉS F, KRAMER A, MARINÉ L, BERGOEING M, SAGÜES R ET AL. Tratamiento Híbrido del Aneurisma Tóraco-Abdominal: Revascularización Extra-Anatómica e Inserción de Endoprótesis. *Rev Méd Chile* 2007; 135: 153-9.
6. DAKE M, KATO N, MITCHELL R, SEMBA C, RAZABI M, SHIMONO T ET AL. Endovascular stent-graft placement for the treatment of acute aortic dissection. *N Engl J Med* 1999; 340: 1546-52.
7. NIENABER C, FATTORI R, LUND G, DIECKMANN C, WOLF W, VON KODOLITSCH Y ET AL. Nonsurgical reconstruction of thoracic aortic dissection by stent-graft placement. *N Engl J Med* 1999; 340: 1539-45.
8. TSAI T, FATTORI R, TRIMARCHI S, ISSELBACHER E, MYRMEL T, EVANGELISTA A ET AL, ON BEHALF OF THE INTERNATIONAL REGISTRY OF ACUTE AORTIC DISSECTION (IRAD). Long-Term Survival in Patients Presenting With Type B Acute Aortic Dissection: Insights From the International Registry of Acute Aortic Dissection. *Circulation* 2006; 114: 2226-31.
9. WIENNERKVIST A, LOCKOWANDT U, RASMUSSEN E, RADEGRAN K. A prospective study of medically treated acute type B aortic dissection. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2006; 32: 349-55.
10. ESTRERA A, MILLER C, SAFI H, GOODRICK J, KEYHANI A, PORAT E ET AL. Outcomes of medical management of acute type B aortic dissection. *Circulation* 2006; 114 (1 Suppl): I384-9.
11. KARMY-JONES R, SIMEONE A, MEISSNER M, GRANVALL B, NICHOLLS S. Descending thoracic aortic dissections. *Surg Clin North Am* 2007; 87: 1047-86.
12. MARUI A, MOCHIZUKI T, MITSUI N, KOYAMA T, KIMURA F, HORIBE M. Toward the best treatment for uncomplicated patients with type B acute aortic dissection: A consideration for sound surgical indication. *Circulation* 1999; 100(19 Suppl): II275-80.
13. JUVONEN T, ERGIN M, GALLA J, LANSMAN S, MCCULLOUGH J, NGUYEN K ET AL. Risk factors for rupture of chronic type B dissections. *J Thorac Cardiovasc Surg* 1999; 117: 776-86.

14. SONG J, KIM S, KIM J, KIM M, KANG D, SEO J ET AL. Long-Term Predictors of Descending Aorta Aneurysmal Change in Patients with Aortic Dissection. *J Am Coll Cardiol* 2007; 50: 799-804.
15. JACOBS T, WON J, GRAVEREAUX E, FARIES P, MORRISEY N, TEODORESCU V ET AL. Mechanical failure of prosthetic human implants: A 10-year experience with aortic stent graft devices. *J Vasc Surg* 2003; 37: 16-26.
16. EGGEBRECHT H, NIENABER C, NEUHÄUSER M, BAUMGART D, KISCHE S, SCHMERMUND A ET AL. Endovascular stent-graft placement in aortic dissection: a meta-analysis. *Eur Heart J* 2006; 27: 489-98.
17. SCHODER M, CZERNY M, CEJNA M, RAND T, STADLER A, SODECK G ET AL. Endovascular repair of acute type B aortic dissection: long-term follow-up of true and false lumen diameter changes. *Ann Thorac Surg* 2007; 83: 1059-66.
18. RESCH T, DELLE M, FALKENBERG M, IVANCEV K, KONRAD P, LARZON T ET AL. Remodeling of the thoracic aorta after stent grafting of type B dissection: a Swedish multicenter study. *J Cardiovasc Surg* 2006; 47: 503-8.
19. XU S, HUANG F, YANG J, LI Z, WANG X, AHZNG Z ET AL. Endovascular repair of acute type B aortic dissection: early and mid-term results. *J Vasc Surg* 2006; 43: 1090-5.
20. KUSAGAWA H, SHIMONO T, ISHIDA M, SUZUKI T, YASUDA F, YUASA U ET AL. Changes in False Lumen After Transluminal Stent-Graft Placement in Aortic Dissections. Six Years' Experience. *Circulation* 2005; 111: 2951-57.
21. NIENABER C, ZANNETTI S, BARBIERI B, KISCHE S, SCHARECK W, REHDE T, INSTEAD STUDY COLLABORATORS. Investigation of stent grafts in patients with type B Aortic Dissection: design of the instead trial—a prospective, multicenter, European randomized trial. *Am Heart J* 2005; 149: 592-9.
22. SVENSSON L, KOUCHOUKOS N, MILLER G. Expert Consensus Document on the Treatment of Descending Thoracic Aortic Disease Using Endovascular Stent-Grafts. *Ann Thorac Surg* 2008; 85: S1-41.